

福島南循環器科病院 化学療法レジメン

レジメン名 : DBd療法 (1コース目)  
 対象疾患 : 多発性骨髄腫

インターバル日数 : 21日  
 休薬期間 :

レジメン内容

薬剤名	day														
	1	2	...	4	5	...	8	9	...	11	12	...	15	...	21
<b>ダラツムマブ</b> 16mg/kg day1 : 生食1000mLで溶解 速度 : 50mL/h 50mL/hから開始、1時間ごとに 50mL/hずつ上げる。最大200mL/hまで。 day8 : 生食500mLで溶解 速度 : 50mL/h 50mL/hから開始、1時間ごとに 50mL/hずつ上げる。最大200mL/hまで。 day15 : 生食500mLで溶解 速度 : 100mL/h 100mL/hから開始、1時間ごとに 50mL/hずつ上げる。最大200mL/hまで。															
<b>デキサメサゾン</b> ※ レナデックス錠4mg 5錠		●		●	●			●		●	●				
<b>デキサメサゾン</b> ※ デキサート注射液 6.6mg 2mL 2瓶 ※ デキサート注射液 3.3mg 1mL 1瓶 生食100mLで溶解し、30分で投与 速度 : 200mL/h ダラツムマブ投与60~90分前投与	●						●						●		
<b>ボルテゾミブ</b> 1.3mg/m <sup>2</sup> ボルテゾミブ3mgを生食1.2mLで溶解し、 必要量使用する。	●			●			●			●					